

UNIVERSITETET I TRONDHEIM
NORGES TEKNISKE HØGSKOLE
INSTITUTT FOR FYSIKK

Faglig kontakt under eksamen:
Navn: Kåre Olaussen
Telefon: 93652

Eksamen i fag 74943 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken
Fredag 16. desember 1994
Tid: 09.00–15.00

Tillatte hjelpemidler: (Alternativ B): Godkjent lommekalkulator.
Rottmann, *Mathematische Formelsammlung*.
Barnett and Cronin, *Mathematical Formulae*.

Oppgave 1:

I denne oppgaven skal du se på Schrödinger-ligningen for en partikkel i et én-dimensjonalt anharmonisk potensial,

$$V(x) = x^{2n}, \quad n = 2, 3, \dots$$

Etter passende skaleringer kan denne ligningen skrives

$$\left[-\frac{d^2}{dx^2} + x^{2n} - \lambda \right] \psi(x) = 0. \quad (1)$$

- Klassifiser ligning (1) etter singularitetenes antall og natur. (Anta at $\lambda > 0$.)
- Sett $\lambda = 0$ og transformer i dette spesialtilfellet ligning (1) til "enklest mulig form", dvs. slik at summen av rangen til alle singularitetene er minst mulig.
- Bestem de mulige ledende asymptotiske oppførsler til løsningene $\psi(x)$ når $x \rightarrow \infty$.
- Skriv ned første ordens WKB kvantiseringsbetingelse for egenverdi problemer av formen

$$\left[-\frac{1}{\epsilon^2} \frac{d^2}{dx^2} + Q(x; \lambda) \right] \psi(x) = 0,$$

med to klassiske vendepunkter, $Q(x, \lambda) = 0$ ved $x = x_{\pm}$.

- Bestem i første ordens WKB tilnærming egenverdiene λ_m til problemet (1). (I dette tilfellet er utviklingsparameteren $\epsilon = 1$.)

Oppgitt:

$$\int_0^1 dt t^{\alpha} (1-t)^{\beta} = \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+2)}.$$

Oppgave 2:

Bestem den ledende asymptotiske oppførsel for integralene

a)

$$I_1(a) = \int_0^\infty dt e^{-t} t^a (1+t)^{-2a}, \quad \text{når } a \rightarrow \infty. \quad (2)$$

b)

$$I_2(a) = \int_0^\infty dt e^{-t} t^a (1+t)^{-a}, \quad \text{når } a \rightarrow \infty. \quad (3)$$

c)

$$I_3(a) = \int_0^\infty dt e^{-t} t^a (1+t)^a, \quad \text{når } a \rightarrow -1^+. \quad (4)$$

Oppgave 3:

I denne oppgaven skal du benytte grensesjiktmetoden til å løse randverdi problemet

$$\varepsilon y'' - y' + \frac{1}{x}y = x, \quad \text{for } 1 < x < 2, \quad y(1) = y(2) = 0. \quad (5)$$

når $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

- a) Bestem mulig(e) posisjon(er) og tykkelse(r), dvs. hvordan tykkelsen skalerer med ε , for grensesjikt i løsningen.
- b) Finn de ytre og indre løsningene til (5).
- c) Finn en uniform tilnærming til løsningen $y(x)$.

Oppgave 4:

I denne oppgaven skal du analysere startverdi problemet

$$\ddot{y}(t) + y(t) + \varepsilon \dot{y}(t)^3 = \cos(t), \quad y(0) = \dot{y}(0) = 0, \quad (6)$$

ved bruk av flerskalautvikling.

- a) Skriv $y(t) = \varepsilon^\alpha Y(t, \tau)$, med $\tau = \varepsilon^\beta t$, og velg eksponentene α og β slik at du får en hensiktsmessig ligning for $Y(t, \tau)$.
- b) Vis at nullte ordens løsning for denne ligningen kan skrives på formen

$$Y_0(t, \tau) = A_0(\tau) \sin t + B_0(\tau) \cos t, \quad (7)$$

og bestem startverdiene for $A_0(\tau)$ og $B_0(\tau)$ ved $\tau = 0$.

- c) Bestem differensialligningene som det er naturlig å pålegge $A_0(\tau)$ og $B_0(\tau)$, og finn fra disse også størrelsene $A'_0(0)$ og $B'_0(0)$.
- d) Ligningssettet i forrige punkt kan reduseres til en annen ordens ligning for kombinasjonen

$$R(\tau) \equiv A_0(\tau)^2 + B_0(\tau)^2.$$

Finn denne, og de tilhørende startbetingelsene for $R(\tau)$.

- e) Bestem den asymptotiske oppførselen til $R(\tau)$ når $\tau \rightarrow \infty$. Finn de tilhørende asymptotiske oppførsler for $A_0(\tau)$ og $B_0(\tau)$.

NB! Forsøk *ikke* å finne en eksakt analytisk løsning til R -ligningen. Det er mulig å forstå den kvalitative oppførselen til $R(\tau)$ ved å tolke denne ligningen som bevegelsesligningen for en partikkel i et ytre potensial, og med et friksjonsledd.

Oppgitt:

$$\begin{aligned}(A \cos t - B \sin t)^3 &= \frac{3}{4}(A^2 + B^2)(A \cos t - B \sin t) \\ &+ \frac{1}{4}(A^2 - 3B^2)A \cos 3t + \frac{1}{4}(B^2 - 3A^2)B \sin 3t.\end{aligned}\tag{8}$$