



NTNU

Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi
Institutt for Fysikk

Eksamen i FY3452 Gravitasjon og Kosmologi

Faglærer: Professor Jens O. Andersen
Institutt for Fysikk, NTNU
Tlf: 73593131

Tirsdag 3. juni 2008
kl. 09.00-13.00

Tillette hjelpemiddel:
Godkjend lommekalkulator
Rottmann: Matematisk Formelsamling
Rottmann: Mathematische Formelsammlung
Barnett & Cronin: Mathematical Formulae

I alle oppgavene bruker vi einheiten slik at $c = G = 1$. Metrikken er $\text{diag}(-1,1,1,1)$. Oppgavesettet er på fire sider. Les oppgaveteksten nøye. Lykke til.

Oppgave 1

I denne oppgava skal vi studere ei roterande skive med radius R og som roterer med vinkelhastighet ω . Labsystemet er eit inertialsystem. Det er hendig å innføre polarkoordinatar $\hat{r}$ og $\hat{\theta}$. Det roterande referansesystemet er eit akselerert referansesystem. Det er det hendig å innføre polarkoordinatar r og θ . Metrikken i det roterande referansesystemet er

$$ds^2 = -(1 - \omega^2 r^2) dt^2 + dr^2 + 2r^2 \omega dt d\theta + r^2 d\theta^2 .$$

a) Ein observatør i $r = R$ roterer rundt med skiva. Kva er eigentida $\Delta\tau$ for ein rotasjon? Uttrykk svaret ved R og ω .

b) γ_{ij} er komponentane til den romlege metriske tensoren og definert ved

$$\gamma_{ij} = g_{ij} - \frac{g_{it}g_{jt}}{g_{tt}},$$

der $i, j = 1, 2$. Den romlege metrikken kan da skrivast som

$$d\Sigma^2 = \gamma_{ij}dx^i dx^j.$$

Vis at den romlege metrikken er

$$d\Sigma^2 = dr^2 + \frac{r^2}{1 - \omega^2 r^2} d\theta^2.$$

Rekn ut arealet av den roterande skiva. Er den romlege geometrien euklidisk? Grunngje svaret.

c) I $r = R$ er det ei ljuskjelde som er i ro i det roterande referansesystemet. Ljuskjelda sender ut ljossignal med frekvens ω_R . Rekn ut frekvensen ω_0 som blir målt av ein observatør som mottek signalet i origo. Kva er tolkninga av denne raudforskyvninga til ein stasjonær observatør i $r = 0$, det vil seie ein observatør som er i ro i origo i det roterande referansesystemet? Kva er tolkninga av denne raudforskyvninga til ein stasjonær observatør i $\hat{r} = 0$, det vil seie ein observatør som er i ro i origo i det labsystemet.

Oppgave 2

Metrikken til eit homogent og isotropt univers er

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[d\chi^2 + \begin{Bmatrix} \sin^2 \chi \\ \chi^2 \\ \sinh^2 \chi \end{Bmatrix} (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right], \quad \begin{Bmatrix} k = 1 \\ k = 0 \\ k = -1 \end{Bmatrix},$$

der k er den romlege krumninga. Friedmans likningar med ein kosmologisk konstant Λ for eit homogent og isotropt univers er

$$\begin{aligned} 3 \frac{\dot{a}^2 + k}{a^2} &= 8\pi\rho + \Lambda, \\ -2 \frac{\ddot{a}}{a} - \frac{\dot{a}^2 + k}{a^2} &= 8\pi p - \Lambda. \end{aligned}$$

a) Kva er $a(t)$, ρ , og p ? Gjer kort greie for den romlege geometrien i dei tre tilfella.

b) I resten av oppgava skal vi studere spesialtilfellet der $p = 0$ og $k = 1$. Vis at det finst ein kritisk verdi ρ_m for tettheiten slik at a er tidsuavhengig. Uttrykk a og ρ_m ved hjelp av Λ .

c) Vi skal nå perturbere dette statiske universet. Vi skriv difor

$$\rho = \rho_m + \delta\rho ,$$

Med denne perturbasjonen blir a tidsavhengig. Er universet stabilt med omsyn på denne perturbasjonen? Grunnge svaret.

Oppgave 3

I denne oppgava skal vi studere eit tidrom med den kulesymmetriske metrikken

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 ,$$

der R er ein konstant.

a) To stasjonære observatørar, Jens og Kristin, har dei romlege koodinatane $r = R/2$, $\theta = 0$ og $\phi = 0$. Kristin er fornøgd med livet og blir værande i $r = R/2$, $\theta = 0$ og $\phi = 0$. Jens kjedar seg og vil utforske tidrommet litt. Han byrjar difor å gå utover i radiell retning. Etter ei stund passerer han flata $r = R$. Forklar kvifor Jens aldri kjem til å sjå Kristin igjen.

b) Vi innfører ein ny tidskoordinat v som er definert ved

$$t = v + \frac{1}{2}R \ln \left| 1 + \frac{r}{R} \right| - \frac{1}{2}R \ln \left| 1 - \frac{r}{R} \right| .$$

Uttrykk metrikken ved hjelp av koodinatane v , r , θ , og ϕ .

c) Ljoslike kurver tilfredsstiller likninga $ds^2 = 0$. Finn alle radielle ljoslige kurver. Skisser kurvene i eit $(\tilde{t}, r)$ -diagram, der $\tilde{t} = v + r$.

Oppgave 4

Denne oppgava består av tre ulike spørsmål som ein kan svare på uavhengig av kvarandre.

a) La G vere i gruppe. Kva vil det seie at G er abelsk. Er $SO(3)$ ei abelsk gruppe? Grunnge svaret. Kor mange generatorar har gruppa $SU(2)$?

b) Lagrangetettheten for eit relativistisk fermion er

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu\psi) - m\bar{\psi}\psi.$$

m er massen til fermiona og γ^μ er fire 4×4 matriser. ψ er ein vektor med 4 komponentar og $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$, $\dagger$ tyder komplekskonjugering og transponering. Vis at $\mathcal{L}$ er invariant under ein *global* fasetransformasjon, det vil seie ein transformasjon på forma

$$\begin{aligned}\psi &\rightarrow e^{i\alpha}\psi, \\ \psi^\dagger &\rightarrow e^{-i\alpha}\psi^\dagger,\end{aligned}$$

der α er ein konstant. Finn den tilhøyrande 4-straumen j^μ . Kan du generalisere Lagrangefunksjonen ovanfor slik at den er invariant under *lokale* fasetransformasjonar?

Vi definerer i tillegg ei matrise γ^5 ved $\gamma^5 = \gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$. Matrisa γ^5 er reell. Matrisene γ^μ antikommuterer med γ^5 :

$$\gamma^\mu\gamma^5 + \gamma^5\gamma^\mu = 0.$$

Ein global kiral fasetransformasjon er definert ved

$$\begin{aligned}\psi &\rightarrow e^{i\gamma^5\alpha}\psi, \\ \psi^\dagger &\rightarrow \psi^\dagger e^{-i\alpha\gamma^5},\end{aligned}$$

der α er ein konstant. For kva verdier av m er $\mathcal{L}$ invariant under ein global kiral fasetransformasjon.

c) Vi ser på standardsituasjonen, der eit inertialsystem S' bevegar seg langs x -aksen med hastigheit v i forhold til inertialsystemet S . Skriv ned transformasjonsformlane mellom koordinatane x, y, z og t i S og koordinatane x', y', z' , og t' i S' . La V_x vere x -komponenten til hastigheiten i S og $V^{x'}$ vere x' -komponenten til hastigheiten i S' . Utlei transformasjonsformelen mellom $V^{x'}$ og V^x .

Oppgitt:

Nöthers teorem:

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

der

$$j^\mu = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \Delta\phi \right].$$