

Lösninger

1 a) Kanoniske form $H\psi = [c\vec{\alpha}(\vec{p} - Q\vec{A}) + \beta Mc^2 + Q\phi] = E\psi$
 med operatorer $\vec{p} = -i\hbar\nabla$ $E = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ For et elektron $Q = -|e|$

$$[c\vec{\alpha}(-i\hbar\nabla - Q\vec{A}) + \beta Mc^2 + Q\phi]\psi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi$$

Dirac-matrisene oppfyller antikommutatorer

$$\{\alpha_i, \alpha_k\}_+ = 2\delta_{ik} \quad \{\beta, \alpha_i\} = 0 \quad \beta^2 = 1 \quad i, k = 1, 2, 3$$

Covariant form

$$(c\gamma^\mu(p_\mu - QA_\mu) - Mc^2)\psi = 0$$

$$\gamma^0 = \beta \quad \vec{\gamma} = \beta\vec{\alpha} \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3$$

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}_+ = 2g^{\mu\nu} \quad g^{\mu\nu} = \begin{cases} 1 & \mu=\nu=0 \\ -1 & \mu=\nu=1,2,3 \\ 0 & \mu \neq \nu \end{cases}$$

$$p_\mu = (E/c, -\vec{p}) = i\hbar\frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad A_\mu = (\phi/c, -\vec{A})$$

$$(c\gamma^\mu(i\hbar\partial_\mu - QA_\mu) - Mc^2)\psi = 0$$

b) Fri partikkel $H\psi = (c\vec{\alpha}\vec{p} + \beta Mc^2)\psi = E\psi$, $E^2 = (Mc^2)^2 + (\vec{p}c)^2$
 i standardrepresentasjonen $\alpha^k = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^k \\ \sigma^k & 0 \end{pmatrix}$ $\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $u = \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix}$ 4-spinor.

$$H\psi = \begin{pmatrix} Mc^2 & c\vec{\sigma}\vec{p} \\ c\vec{\sigma}\vec{p} & -Mc^2 \end{pmatrix} \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \begin{pmatrix} Mc^2 u_a + c\vec{\sigma}\vec{p} u_b \\ c\vec{\sigma}\vec{p} u_a - Mc^2 u_b \end{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)}$$

$$= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} E \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)}$$

$$(E - Mc^2)u_a - c\vec{\sigma}\vec{p}u_b = 0$$

$$(E + Mc^2)u_b - c\vec{\sigma}\vec{p}u_a = 0$$

$$u_b = \frac{c\vec{\sigma}\vec{p}}{E + Mc^2} u_a \quad u_a = X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

2 uavhengige 2-spinorer: $X_1^2 + X_2^2 = 1$ (normering) For $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$u(\vec{p}) = N \begin{pmatrix} X \\ \frac{c\vec{\sigma}\vec{p}}{E + Mc^2} X \end{pmatrix}$$

Normering: $u^\dagger u = |N|^2 X^\dagger \left(1 + \left(\frac{c\vec{\sigma}\vec{p}}{E + Mc^2}\right)^2\right) X = |N|^2 \frac{(E + Mc^2)^2 + c^2 \vec{p}^2}{(E + Mc^2)^2} X^\dagger X = |N|^2 \frac{2E}{E + Mc^2} = \frac{E}{Mc^2}$

$$\text{gitt } N = \sqrt{\frac{E + Mc^2}{2Mc^2}}$$

$$u(\vec{p}) = \sqrt{\frac{E + Mc^2}{2Mc^2}} \begin{pmatrix} X \\ \frac{c\vec{\sigma}\vec{p}}{E + Mc^2} X \end{pmatrix}$$

For $\frac{|\vec{p}|}{Mc} \ll 1$

$$\psi = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \sqrt{\frac{E + Mc^2}{2Mc^2}} \begin{pmatrix} X \\ \frac{c\vec{\sigma}\vec{p}}{E + Mc^2} X \end{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)}$$

$$E = \sqrt{(Mc^2)^2 + (\vec{p}c)^2} \approx Mc^2 + \frac{\vec{p}^2}{2M} + \dots$$

$$\approx \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \sqrt{\frac{2Mc^2 + \frac{\vec{p}^2}{2M}}{2Mc^2}} \begin{pmatrix} X \\ \frac{c\vec{\sigma}\vec{p}}{2Mc^2 + \frac{\vec{p}^2}{2M}} X \end{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)} \approx \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \left(1 + \frac{\vec{p}^2}{8M^2c^2} + \dots\right) \begin{pmatrix} X \\ \frac{c\vec{\sigma}\vec{p}}{2Mc^2} X \end{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)}$$

4c) Variation: For $S = \int \mathcal{L} d^4x = \text{ekstremal} \Rightarrow \frac{\delta S}{\delta \psi} = 0$

med $\mathcal{L} = c \bar{\psi} (i \gamma^\mu \partial_\mu - M c) \psi$ giv Euler-Lagrange-lign. ($\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} - \frac{d}{dx^\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \psi)} = 0 \Rightarrow c \gamma^0 (i \gamma^\mu \partial_\mu - M c) \psi = 0$$

Multiplikation med $\frac{1}{c} \gamma^0$ giver så $(i \gamma^\mu \partial_\mu - M c) \psi = 0$

Kanoniske impulser til ψ :

$$\bar{\pi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = i \hbar \bar{\psi} \gamma^0 = \underline{i \hbar \psi^\dagger}$$

d) Kvantiseringsskemaet for fermion felt:

Samtidigt ~~kanoniske~~ kommutatorerne for de kanoniske konjugerede felt ψ og impulserne π :

$$\{\psi(\vec{r}, t), \pi(\vec{r}', t)\}_+ = i \hbar \delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\{\psi(\vec{r}, t), \psi(\vec{r}', t)\}_+ = 0$$

$$\{\pi(\vec{r}, t), \pi(\vec{r}', t)\}_+ = 0$$

$$\{\psi(\vec{r}, t), \psi^\dagger(\vec{r}', t)\}_+ = \delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\{\psi(\vec{r}, t), \psi^\dagger(\vec{r}', t)\}_+ = 0$$

$$\{\psi^\dagger(\vec{r}, t), \psi^\dagger(\vec{r}', t)\}_+ = 0$$

e) $H = \int \psi^\dagger i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} d^3r$

$$= \sum_{ss'} \int d^3r \int d^3p \int d^3p' \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \sqrt{\frac{M c^2 \hbar^2}{E E'}} \left(b^\dagger u e^{\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})} + d^\dagger v e^{\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}'\vec{r})} \right) E' \left(b u e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}'\vec{r})} - d^\dagger v e^{\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})} \right)$$

$$= \sum_{ss'} \int d^3p \int d^3p' \sqrt{\frac{M c^2 \hbar^2}{E E'}} \left(b^\dagger b' u^\dagger u' e^{\frac{i}{\hbar}(E - E')t} \delta^3(\vec{p} - \vec{p}') - b^\dagger d'^\dagger u^\dagger v' e^{\frac{i}{\hbar}(E + E')t} \delta^3(\vec{p} + \vec{p}') \right. \\ \left. + d b' v^\dagger u' e^{-\frac{i}{\hbar}(E + E')t} \delta^3(\vec{p} + \vec{p}') - d d'^\dagger v^\dagger v' e^{-\frac{i}{\hbar}(E - E')t} \delta^3(\vec{p} - \vec{p}') \right)$$

$$= \sum \int d^3p M c^2 \left(b^\dagger b \frac{E}{M c^2} - 0 + 0 - d d^\dagger \frac{E}{M c^2} \right) \quad \text{Benyttes: } u^\dagger(\vec{p}, t) u(\vec{p}, t) = \frac{E}{M c^2} \delta_{ss'} \\ u^\dagger(\vec{p}, t) v(-\vec{p}, t) = 0$$

$$= \sum \int d^3p E (b^\dagger b - d d^\dagger) = \sum \int d^3p E (b^\dagger b + d^\dagger d - 1) \quad \text{med } E = \sqrt{(M c^2)^2 + \vec{p}^2 c^2}$$

Indfører antaloperatorer for elektroner og positroner

$$N_e(p, s) = b^\dagger(p, s) b(p, s)$$

$$N_p(p, s) = d^\dagger(p, s) d(p, s)$$


$$H = \sum \int d^3p E (N_e + N_p - 1)$$

Siste ledd $\sum \int d^3p (-1)$ giver uendelig stor energi. Denne vakuumenergien trækker vi fra ved hjælp af en normalordner som


for fermioner giv $N_{ord} d d^\dagger = -d^\dagger d$

$$H = N_{ord} \sum \int d^3p E (b^\dagger b - d d^\dagger) = \underline{\sum \int d^3p E (N_e + N_p)}$$

opgave 2 a) i)



ii)



$$A^0 = \frac{e}{4\pi r}, \quad \vec{A} = 0$$

$$e_p = -e$$

$$S^{(i)} = \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{\frac{1}{2} \cdot 4} (2\pi)^{4-4+4} \left(\frac{m}{\epsilon_1} \frac{m}{\epsilon_2} \frac{M}{E_1} \frac{M}{E_2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\int \bar{u}(p_2, s_2) (-i) e \gamma^\mu \delta^4(p_2 - p_1 - q) \frac{(-i) g_{\mu\nu}}{q^2} u(p_1, s_1) \bar{u}(p_3, s_3) (-i) e \gamma^\nu \delta^4(p_3 - p_4 + q) u(p_4, s_4) d^4q$$

$$S^{(i)} = \frac{-i e^2}{(2\pi)^2} \frac{m M}{(\epsilon_1 \epsilon_2 E_1 E_2)^{\frac{1}{2}}} \frac{\bar{u}(p_2, s_2) \gamma^\mu u(p_1, s_1) \bar{u}(p_3, s_3) \gamma_\mu u(p_4, s_4)}{(p_1 - p_2)^2} \delta^4(p_2 + p_3 - p_1 - p_4)$$

$$ii) S^{(ii)} = \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{\frac{1}{2} \cdot 4} \left(\frac{m}{\epsilon_1} \frac{m}{\epsilon_2} \right)^{\frac{1}{2}} \bar{u}(p_2, s_2) (-i) e \gamma^\mu A_\mu^{tree}(\vec{p}_2 - \vec{p}_1) \delta(\epsilon_1 - \epsilon_2) u(p_1, s_1)$$

$$= \frac{i e^2}{(2\pi)^2} \frac{m}{(\epsilon_1 \epsilon_2)^{\frac{1}{2}}} \frac{\bar{u}(p_2, s_2) \gamma^0 u(p_1, s_1)}{(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)^2} \delta(\epsilon_1 - \epsilon_2) = \frac{i e^2}{(2\pi)^2} \frac{m}{(\epsilon_1 \epsilon_2)^{\frac{1}{2}}} \frac{u^\dagger(p_2, s_2) u(p_1, s_1)}{|\vec{p}_1 - \vec{p}_2|^2} \delta(\epsilon_1 - \epsilon_2)$$

Har benyttet at for Coulomb feltet er:

$$A_0^{tree}(q) = \frac{+e}{4\pi} \int \frac{1}{r} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} d^3r = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{e}{4\pi} \int \frac{e^{-ar}}{r} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} r^2 dr d\Omega = -\frac{e}{(q^2)}$$

$$\vec{A}(q) = 0 \quad \text{da} \quad \vec{A}(\vec{r}) = 0.$$

c) For lave energier $\frac{p_i}{m} \ll 1$ $\frac{p_i}{M} \ll 1$ er $\epsilon_i \approx m$, $E_i \approx M$, $(p_1 - p_2)^2 = (\epsilon_1 - \epsilon_2)^2 - (\vec{p}_1 - \vec{p}_2)^2 \approx -(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)^2$

Da $M \gg m$ vil protonet go praktisk talt uforandret gennem støt $\vec{p}_1 \approx \vec{p}_2 \approx \vec{P}$

Protonbidraget til $S^{(i)}$ vil g:

$$\bar{u}(p_2, s_2) \gamma_0 u(p_1, s_1) \approx u^\dagger(p_2, s_2) u(p_1, s_1) \approx \delta_{s_1 s_2}$$

$$\begin{aligned} \bar{u}(p_3, s_3) \gamma_k u(p_4, s_4) &\approx \left(X^\dagger, \left(\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{P}}{2M} X \right)^\dagger \right) (-\sigma_k - \sigma_k^\dagger) \left(\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{P}}{2M} X \right) \\ &\approx - \left(X^\dagger, \left(\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{P}}{2M} X \right)^\dagger \right) \left(\sigma_k^\dagger \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{P}}{2M} X \right) \approx - \left(X^\dagger \sigma_k^\dagger \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{P}}{2M} X + X^\dagger \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{P}}{2M} \sigma_k X \right) \\ &\approx - \left(X^\dagger (\sigma_k^\dagger \sigma_k + \sigma_k^\dagger \sigma_k) \frac{P_k}{2M} X \right) = -\frac{P_k}{M} \delta_{s_1 s_2} \end{aligned}$$

dvs bidraget fra γ_k -ledet er negligerbart i forhold til bidraget fra γ_0

$$S^{(i)} \approx \frac{-i e^2}{(2\pi)^2} \frac{m M}{(m^2 M^2)^{\frac{1}{2}}} \frac{\bar{u}(p_2, s_2) \gamma^0 u(p_1, s_1)}{-(\vec{p}_1 - \vec{p}_1)^2} \delta(\epsilon_1 - \epsilon_2) \approx S^{(ii)}$$

Energi bevarelse $\delta(\epsilon_1 - \epsilon_2)$ sørger for at $|\vec{p}_1| = |\vec{p}_2|$ dvs vil si elastisk spredning. Da $M \gg m$ vil alle impuls retningsforandringer være tilladt dvs $\delta^3(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 - \vec{p}_3 - \vec{p}_4)$ altid opfyldt.

For lave elektronenergier er altså spredning mot et proton ekvivalent med spredning mot et fast Coulomb potentiel med protonladning.