

## Øving 10

### Van der Waals tilstandslegning

a) Van der Waals tilstandslegning for stoffmengden 1 mol,

$$(p + a/V^2)(V - b) = RT,$$

gir kritisk punkt

$$T_c = 8a/27Rb \quad , \quad p_c = a/27b^2 \quad , \quad V_c = 3b.$$

Vis at  $a$  og  $b$  – dersom vi velger å parametrisere med utgangspunkt i kritisk temperatur og trykk – kan uttrykkes som

$$a = 27R^2T_c^2/64p_c \quad , \quad b = RT_c/8p_c.$$

Vis også at dette gir verdien  $8/3$  for kombinasjonen  $RT_c/p_cV_c$ .

b) Vis at dersom vi innfører dimensjonsløse ("reduserte") størrelser  $p_r = p/p_c$ ,  $T_r = T/T_c$  og  $V_r = V/V_c$ , kan van der Waals tilstandslegning skrives på formen

$$(p_r + 3/V_r^2)(3V_r - 1) = 8T_r.$$

[Dette kalles gjerne "loven om korresponderende tilstander" (van der Waals, 1880): Ulike stoffer som oppfyller van der Waals tilstandslegning, er i korresponderende tilstander dersom de har samme trykk, temperatur og volum, målt i enheter av kritisk trykk, temperatur og volum.]

c) Kjølemediet R134a (1,1,1,2-tetrafluoretan; benyttet i varmepumpa i laboppgave 1) har kritisk temperatur, trykk og (molart) volum henholdsvis 374 K, 4060 kPa og 0.198 L. Bruk disse eksperimentelle verdiene til å parametrisere koeffisientene  $a$  og  $b$  for R134a, som beskrevet i punkt a). Hva er den eksperimentelle verdien for  $RT_c/p_cV_c$  for R134a? [Gasskonstanten er  $R = 8.314 \text{ J/mol K}$ .]

d) Plott (van der Waals) isotermer for (1 mol av) R134a i et  $(p, V)$ -diagram.

Lag først en figur der isotermer tegnes opp for temperaturer mellom 334 og 414 K, med intervall 20 K mellom påfølgende kurver. Beregn  $p(V)$  for  $V$  mellom 0.12 og 2.00 L, mens kurvene plottes i et diagram der  $V$ -aksen går fra 0 til 1 L og  $p$ -aksen fra 0 til 10 MPa. Tegn også, i samme figur, isotermer basert på ideell gass tilstandslegning for laveste og høyeste temperatur, dvs 334 og 414 K.


Legg merke til overgangen fra monotont avtagende kurver til ikke-monotone  $p(V)$  ved  $T = 374 \text{ K}$ .

For Matlabtips, se matlabtips10.pdf.

e) For temperaturer  $T$  under kritisk temperatur  $T_c$  gir van der Waals tilstandsligning koeksistens mellom væske og gass for en bestemt verdi av trykket,  $p_{co}$ , der det såkalte koeksistenstrykket  $p_{co}$  fastlegges ved hjelp av Maxwells regel om like arealer, dvs like stort gult (lyst) som blått (mørkt) areal i figuren under, alternativt den ekvivalente betingen

$$p_{co} \cdot (V_g - V_v) = \int_{V_v}^{V_g} p(V) dV,$$

der  $V_v$  og  $V_g$  er hhv (molart) væskevolum og gassvolum.



Bruk Maxwells regel om like arealer til å fastlegge koeksistenstrykket  $p_{co}$ , med en nøyaktighet på 0.1 kPa, for temperaturen  $T = 331$  K. Dette tilsvarer ”typisk temperatur ved utgang kompressor” ( $T_2$ ) i laboppgave 1, se Tabell 1.1 side 9 i Labheftet. I labforsøket er trykket der ca 10.5 bar, betydelig mindre enn  $p_{co}$ , slik at kjølemediet er i gassform.